

زگیل تناسلی + شفا کلینیک

۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱

زگیل تناسلی یا ویروس پاپیلوما‌ی انسانی، جزو شایع ترین عفونت های آمیزشی محسوب می گردد، ویروس HPV که نوعی ویروس دی ان ای دار است عامل اصلی بروز زگیل های تناسلی می باشد. این بیماری در اوایل ظهور خود به شکل زگیل های بسیار کوچک در ناحیه تناسلی فرد نمایان می گردد. اگر از زگیل تناسلی رنج می برید و می خواهید اطلاعات مفیدی درباره آن کسب کنید حتما حتما این مقاله شفا کلینیک را تا انتها مطالعه کنید.

شفا کلینیک
Shafa Clinic

مرکز درمان بیماری های نشیمنگاه، بالیزر بدون بیهوشی و درد در یک جلسه

زگیل تناسلی

۰۲۱-۶۶۹۲۸۶۳۳
۰۲۱-۶۶۹۲۸۷۱۲
۰۹۱-۶۸۶۵۷۸۱
۰۹۱-۶۸۶۵۷۸۲

@shafaclinicads www.shafacliniconline.com

بلوار کشاورز، بین کارگر و جمال زاده
جنب آزمایشگاه نور، پلاک ۹۵، طبقه ۵، واحد ۸

انواع زگیل تناسلی

زگیل های تناسلی به دو نوع زیر تقسیم می شوند:

- زگیل های تناسلی کم خطر : محل بروز و ایجاد این نوع از زگیل های تناسلی بیشتر در قسمت های بیرونی ناحیه تناسلی بوده و کمتر در نواحی داخلی ایجاد می شوند. همچنین باید گفت که این نوع از زگیل های تناسلی موجب بروز سرطان در افراد نمی شوند.

- زگیل های تناسلی پرخطر : این نوع از زگیل های تناسلی به قسمت های داخلی و درونی دستگاه تناسلی نفوذ نموده و عامل اصلی ایجاد سرطان هستند.

چه اشخاصی بیشتر در معرض ابتلا به زگیل تناسلی قرار دارند؟

- افرادی که رابطه جنسی محافظت شده ندارند.
- اشخاصی که بدون آگاهی از سابقه و سلامت جنسی دیگران با آن ها وارد رابطه می شوند.
- افرادی که دارای روابط آزاد بوده و از نظر جنسی بسیار فعال می باشند.
- اشخاصی که به سایر عفونت های جنسی مبتلا هستند.
- افرادی که دارای بیش از ۱ شریک جنسی می باشند.

شفا کلینیک
Shafa Clinic

مرکز درمان بیماری های نشیمنگاه، بالیز بدون بیهوشی و درد در یک جلسه

زگیل تناسلی

۰۲۱-۶۶۹۲۸۶۳۳
۰۲۱-۶۶۹۲۸۷۱۳
۰۹۱۰۶۸۶۵۷۸۱
۰۹۱۰۶۸۶۵۷۸۲

shafaclinicads @shafaclinicads www.shafacliniconline.com

بلوار کشاورز، بین کارگر و جمال زاده
جنب آزمایشگاه نور، پلاک ۹۵، طبقه ۵، واحد ۸

عوارض ابتلا به زگیل های تناسلی

باید گفت که در بیشتر موارد زگیل تناسلی مشکل خاصی را برای افراد ایجاد نکرده و بی خطر هستند ولی در برخی موارد دیگر مشکلات جدی را برای آن ها در پی خواهند داشت که عبارتند از:

۱. ایجاد سرطان : این امکان وجود دارد که ویروس پاپیلوما‌ی انسانی منجر به بوجود آمدن سرطان سوراخ مقعد، سرطان واژن و سرطان سرویکس رحم در افراد گردد.
۲. ایجاد مشکلات بارداری : یکی از مشکلاتی که زگیل‌های تناسلی در دوران بارداری ایجاد می‌کنند اختلال در دفع ادرار می‌باشد.

همچنین باید گفت که ابتلا به زگیل ناحیه تناسلی موجب کاهش توانایی واژن در هنگام زایمان طبیعی شده و در موارد نادر ممکن است ویروس اچ پی وی به گلوئی نوزاد منتقل شده و او را درگیر کند. ابتلا به عفونت بوسیله ویروس HPV در دستگاه تناسلی می‌تواند به سرطان دهانه رحم منجر شود. ویروس HPV دارای انواع مختلفی بوده و تمام انواع آنها باعث بروز سرطان نمی‌شوند. به منظور پیشگیری از وقوع مشکل، انجام آزمایش پاپ اسمیر توصیه می‌شود.

روش های پیشگیری از ابتلا به زگیل تناسلی

برای پیشگیری از ابتلا به زگیل ناحیه تناسلی، باید تعداد شرکای جنسی، محدود شود. همچنین، اطمینان از سلامت و عدم ابتلای شریک یا شرکای جنسی به این بیماری، بسیار حائز اهمیت است. استفاده از کاندوم بعنوان یک محافظ اندام تناسلی نیز می‌تواند یک سد محافظتی محسوب شود. واکسیناسیون نیز جزو یکی دیگر از راهکارها برای پیشگیری از ابتلا به زگیل تناسلی می‌باشد.

- استفاده از واکسن : تزریق واکسن‌های گارداسیل ۹ یکی از روش‌های مصون ماندن از ابتلا به این مشکل می‌باشد که قابل تزریق به افراد بین ۹ تا ۴۵ سال می‌باشد. نکته‌ای که افراد باید در رابطه با تزریق این واکسن‌ها بدانند این است که تاثیرگذاری تزریق زمانی دارای تاثیر بیشتری خواهد بود که فرد درگیر ویروس اچ پی وی نباشد.
- استفاده از کاندوم : رابطه جنسی محافظت شده با کاندوم، احتمال ابتلا به ویروس اچ پی وی را تا حد نسبتاً زیادی کاهش می‌دهد. عملکرد کاندوم به گونه‌ای است که خطر انتقال و انتشار ویروس HPV را کاهش داده و کم می‌کند.
- از برقراری روابط جنسی آزاد و پرخطر بپرهیزید : چنانچه اقدام به برقراری اینگونه روابط می‌کنید بهتر است تا پیش از آن از شریک خود در مورد بیماری‌هایی که به آن‌ها ابتلا دارد سوال کرده و مطمئن شوید که به بیماری‌های جنسی مبتلا نیست.

نشانه‌ها و علائم زگیل تناسلی

زگیل تناسلی از نظر ظاهری شباهت بسیار زیادی به زگیل‌های عادی دارند تنها تفاوت میان آن‌ها، محل ایجادشان است. زگیل‌های تناسلی فقط می‌توانند در نواحی مخاطی بدن رشد کنند که این نواحی عبارتند از:

- ناحیه مقعد
- ناحیه تناسلی
- ناحیه دهان (زبان، لب‌ها و گلو)؛ در صورت برقراری رابطه جنسی دهانی با فردی که آلوده می‌باشد ممکن است این زگیل‌ها در اطراف گلو، زبان و لب‌های فرد بروز نمایند.

مهم‌ترین نشانه‌های زگیل تناسلی

۱. وجود زائده‌هایی سفت، برجسته و گوشتی شبیه به زگیل در اطراف نواحی دهان، ناحیه تناسلی و مقعد
۲. وجود تک زگیل‌هایی به شکل پراکنده، بزرگ یا ریز و متراکم شبیه به خوشه
۳. احساس درد در هنگام برقراری رابطه جنسی یا ادرار کردن
۴. احساس خارش و سوزش در محل زگیل‌ها

شفا کلینیک
Shafa Clinic

مرکز درمان بیماری های نشیمنگاه ، بالیزر بدون بیهوشی و درد در یک جلسه

زگیل تناسلی

۰۲۱-۶۶۹۲۸۶۳۳
۰۲۱-۶۶۹۲۸۷۱۲
۰۹۱۰۶۸۶۵۷۸۱
۰۹۱۰۶۸۶۵۷۸۲

shafaclinicads @shafaclinicads www.shafacliniconline.com

بلوار کشاورز، بین کارگر و جمال زاده
جنب آزمایشگاه نور، پلاک ۹۵، طبقه ۵، واحد ۸

online

علت ایجاد زگیل های تناسلی چیست؟

همانگونه که گفتیم نوعی ویروس انسانی به نام HPV دلیل اصلی ایجاد زگیل تناسلی می باشد، این ویروس بسیار مسری است به طوریکه بلافاصله بعد از تماس پوست به پوست و برقراری رابطه جنسی با شخص مبتلا، وارد بدن می گردد. ویروس اچ پی وی بیش از ۱۰۰ نوع مختلف دارد به طوریکه نوعی از این ویروس ها که کم خطر هستند تنها موجب ایجاد زگیل های تناسلی شده و خطر جدی تری را برای افراد به دنبال ندارند ولی برخی دیگر ارتباط مستقیمی با ایجاد بعضی از سرطان های زیر دارند:

- سرطان مقعد
- سرطان دهانه رحم
- سرطان آلت تناسلی مرد
- سرطان زبان
- سرطان واژن
- سرطان دهان
- سرطان گلو

• سرطان حنجره

مهم ترین و اصلی ترین عامل برای انتقال این بیماری رابطه جنسی و برقراری رابطه پوست به پوست مستقیم با شخص مبتلا می باشد و استفاده از کاندوم تاثیر چندانی در کاهش خطر انتقال این ویروس ندارد، بنابراین شریک جنسی خود را با دقت انتخاب کنید. اگر با بروز این بیماری در کودکان مواجه شویم دو احتمال را باید مورد بررسی قرار دهیم:

۱. سوءاستفاده جنسی از کودک
۲. تماس دست شخص آلوده با پوست کودک

شفا کلینیک
Shafa Clinic
online

دانشتگی های مهم HPV

هم مردان و هم زنان
را درگیر می کند

عموما افراد ۱۵ تا ۲۴ سال به میزان
بیشتری در معرض این ویروس قراردارند

عامل اصلی بروز زگیل تناسلی
و برخی از سرطان ها می باشد

از طریق تماس با ناحیه آلوده به ویروس
خصوصاً از طریق روابط جنسی بین افراد
منتقل می شود

آیا زگیل های تناسلی در زنان با مردان متفاوت است؟

زگیل تناسلی در زنان می تواند نواحی دهانه و دیواره های واژن و مقعد، کانال مقعد و دهانه رحم را درگیر کند. همچنین در صورت داشتن ارتباطات جنسی از راه دهان، گاهی لب ها، زبان و گلو نیز آلوده به این بیماری می شود. زگیل ناحیه تناسلی در مردان می تواند در نوک یا در طول آلت تناسلی، بیضه ها یا مقعد شکل گیرد. در مردان نیز در صورت داشتن ارتباط جنسی دهانی، ممکن است ناحیه دهان، زبان و گلو درگیر بیماری شود.

نحوه انتقال ویروس

این بیماری ممکن است در مواردی از قبیل برقراری ارتباط جنسی بدن استفاده از آلات محافظتی از اندام تناسلی، از طریق شریک جنسی آلوده به فرد سالم انتقال پیدا کند. به همین دلیل هر یک از شرکای جنسی در صورت ابتلا به این عارضه باید حتماً به فرد مقابل، موضوع را اطلاع دهد. سیستم ایمنی ضعیف نیز یکی دیگر از عواملی است که احتمال ابتلا به این بیماری را در ارتباط جنسی کنترل نشده، شدت می بخشد.

زگیل تناسلی و بارداری

ابتلا به زگیل تناسلی در دوران بارداری، می تواند مشکلاتی را در زمان زایمان ایجاد کند. گاهی اوقات این زگیل ها بزرگ شده و زایمان را برای مادر دشوار می کند. بعلاوه، تغییرات هورمونی در طول دوره بارداری، گاهی بر روی بزرگ شدن و تکثیر زگیل ها و زیاد شدن تعداد آنها نیز تاثیر گذار است.


- آیا کودک متولد شده از مادر مبتلا به زگیل در تناسلی، در معرض آسیب است؟

متأسفانه، در برخی موارد در صورت ابتلا مادر به زگیل در ناحیه تناسلی، کودک نیز در ناحیه مجرای تنفسی از راه گلو، به این بیماری دچار می شود. در چنین شرایطی لازم است بمنظور بازگشایی مسیر تنفس، کودک تحت جراحی قرار گیرد.

بهترین درمان زگیل تناسلی در شفا کلینیک آنلاین

شفا کلینیک آنلاین یکی از تخصصی ترین و پیشرفته ترین مراکز موجود برای تشخیص و درمان زگیل های تناسلی است که با استفاده از تجهیزات فوق مدرن و به روز به درمان زگیل تناسلی با لیزر که موثرترین روش در حال حاضر برای درمان این بیماری می باشد، می پردازد. این عارضه شاید به نظر ساده و بسیار کوچک به نظر برسد ولی به قدری خطرناک هستند که می توانند بدن شمار را میزبان انواع سرطان نمایند، بنابراین در انتخاب کلینیک دقت کرده و کلینیکی را انتخاب کنید که از تیمی متخصص تشکیل شده باشد.

Shafa Clinic
online



زگیل تناسلی

۰۲۱-۶۶۹۲۸۶۳۳
۰۲۱-۶۶۹۲۸۷۱۲
۰۹۱۰۶۸۶۵۷۸۱
۰۹۱۰۶۸۶۵۷۸۲

shafaclinicads

@shafaclinicads

www.shafacliniconline.com

بلوار کشاورز، بین کارگر و جمال زاده
جنب آزمایشگاه نور، پلاک ۹۵، طبقه ۵، واحد ۸

Shafa Clinic

درمان زگیل تناسلی

زگیل های تناسلی ، یکی از شایع ترین عفونت هایی است ، که از طریق آمیزش جنسی منتقل می شود و عامل بروز این عفونت ، ویروس HPV می باشد. زگیل های تناسلی ، در بافت های مرطوب اندام جنسی نمود پیدا می کنند ، و به صورت برآمدگی های کوچکی به نظر می رسند. اگر زگیل های تناسلی ، درد و آزاری برای شما ایجاد نکنند ، ممکن است نیازی به اتخاذ روند درمانی نیز نباشد. اما در صورت بروز سوزش ، خارش و درد در اندام تناسلی ، یا برای پیشگیری از انتقال احتمالی عفونت به فرد دیگر ، و جلوگیری از پراکنده شدن آن در سایر بخش های اندام جنسی ، می توانید برای درمان آن به پزشک مراجعه کنید. او پس از معاینه ، راه های مختلف درمان را به شما پیشنهاد می دهد.

راه های درمان زگیل ناحیه تناسلی

- استفاده از دارو برای درمان زگیل تناسلی

در این روند درمانی ، از پمادها و محلول هایی استفاده می شود ، که مستقیماً بر روی زگیل اعمال شده و آن را از بین می برند. البته جهت استعمال برخی از آن ها نیاز است ، به پزشک مراجعه نمایید تا او دارو را در محل مورد نظر استفاده کند.

- کرم موضعی ایمی کیمود (Imiquimod)

این کرم با نام تجاری آلدرا نیز شناخته می شود. کرم موضعی ایمی کیمود ، سبب تقویت سیستم ایمنی و دفاعی بدن می شود ؛ از این رو بدن توانایی لازم برای مقابله با زگیل های تناسلی ، را به دست می آورد. تا زمانی که کرم کاملاً جذب ناحیه تناسلی نشده است ، رابطه جنسی برقرار نکنید ؛ زیرا برای پوست پارتنرتان آزار دهنده خواهد بود.

- تری کلرواستیک اسید

این ماده شیمیایی ، که برای درمان زگیل تناسلی نیز کاربرد پذیر است ، زگیل های تناسلی را می سوزاند و تا حدودی سوزش و درد به همراه دارد.

- پماد سینکتکاینز (Sinecatechins)

این پماد برای از بین بردن ، زگیل های خارجی اندام جنسی یا زگیل های اطراف مقعد ، مورد استفاده قرار می گیرد. پس از استعمال پماد سینکتکاینز ، پوست اندام جنسی تا حدودی به قرمزی ، سوزش یا خارش و درد ، دچار می شود.

شفا کلینیک
Shafa Clinic

مرکز درمان بیماری های نشیمنگاه ، بالیزر بدون بیهوشی و درد در یک جلسه

Cervical cancer

Human papillomavirus

زگیل تناسلی

۰۲۱-۶۶۹۲۸۶۳۳
۰۲۱-۶۶۹۲۸۷۱۲
۰۹۱۰۶۸۶۵۷۸۱
۰۹۱۰۶۸۶۵۷۸۲

@shafaclinicads

www.shafacliniconline.com

بلوار کشاورز، بین کارگر و جمال زاده
جنب آزمایشگاه نور، پلاک ۹۵، طبقه ۵، واحد ۸

پودوفیلین یک محلول با ترکیبات گیاهی است ، که به تخریب زگیل ها کمک می کند. برای استعمال این محلول باید به پزشک مراجعه کنید. پودوفیلوکس نیز از ترکیبات مشابه ساخته شده است ؛ اما تفاوت آن با پودوفیلین این است ، که استعمال آن در خانه امکان پذیر است. پودوفیلوکس تنها برای زگیل های خارجی قابل استفاده می باشد. همچنین استعمال آن برای زنان باردار توصیه نمی شود. اثرات جانبی ناشی از این محلول ، سوزش خفیف پوست ، درد یا گرفتگی می باشد.

در شرایط زیر ، برای از بین بردن زگیل تناسلی ، می توان به پروسه های جراحی روی آورد:

- در صورتی که اندازه زگیل های تناسلی بزرگ باشند.
- چنانچه استعمال دارو در درمان آن ها مؤثر واقع نشده باشد.
- اگر که فرد در دوران بارداری به زگیل تناسلی مبتلا شده باشد.

• کرایوتراپی (انجماد با استفاده از نیتروژن مایع)

در عمل انجماد یا کرایوتراپی ، پزشک با استفاده از نیتروژن مایع ، سبب انجماد زگیل تناسلی می شود. سپس ، وی اجازه می دهد تا دمای بافت زگیل و نواحی اطراف آن ، کاهش یابد و همین تغییرات ناگهانی دما ، سبب تخریب بافت زگیل می شود. با توجه به بزرگی یا کوچکی زگیل ها ، پزشک تعداد دفعات تکرار کرایوتراپی را مشخص می نماید. احتمال دارد در طول فرایند کرایوتراپی ، سوزش خفیفی احساس کنید.

• الکتروکاتری

در روند الکتروکاتری ، پزشک با استفاده از جریان الکتریکی کم ولتاژ ، زگیل های موجود در آلت جنسی آقایان ، واژن و مقعد را می سوزاند. بروز کمی درد در طول فرایند ، محتمل است ؛ به همین دلیل دکتر از داروی بی حسی موضعی استفاده می کند. در صورت تعدد زگیل ، ممکن است فرد تحت بیهوشی عمومی قرار گیرد. پس از پایان پروسه الکتروکاتری ، احتمال دارد درد خفیف ، ورم و قرمزی ، بروز پیدا کند.

• برش جراحی

پزشک با استفاده از تیغ جراحی ، در اطراف زگیل تناسلی یک برش ایجاد می کند. از همین طریق ، این عارضه را از پوست جدا کرده و آن را از اندام جنسی ، خارج می کند. در پایان عمل ، برش ها با استفاده از بخیه ، بسته می شوند. پروسه جراحی این عارضه ، تحت بی حسی موضعی یا بیهوشی عمومی انجام می پذیرد. معمولاً برای درمان زگیل های بازگشتی ، عمل جراحی انجام می شود. این پروسه ممکن است درد خفیفی را در پی داشته باشد.

شفا کلینیک
Shafa Clinic

مرکز درمان بیماری های نشیمنگاه، بالیزر بدون بیهوشی و درد در یک جلسه

شفا کلینیک

زگیل تناسلی

۰۲۱-۶۶۹۲۸۶۳۳
۰۲۱-۶۶۹۲۸۷۱۲
۰۹۱۰۶۸۶۵۷۸۱
۰۹۱۰۶۸۶۵۷۸۲

shafaclinicads @shafaclinicads www.shafacliniconline.com

بلوار کشاورز، بین کارگر و جمال زاده
جنب آزمایشگاه نور، پلاک ۹۵، طبقه ۵، واحد ۸

Shafa Clinic

درمان زگیل تناسلی با لیزر

در رویکرد لیزر درمانی، برای تخریب زگیل تناسلی، از پرتوهای نوری پر توان استفاده می شود. این پروسه تا حدودی هزینه بر محسوب شده، و عموماً برای درمان زگیل هایی کاربرد دارد، که در سطح گسترده ای پراکنده شده اند و همچنین دیگر روندهای درمانی، بر روی آن ها تأثیر چشمگیری نداشته اند. یکی از مزایای لیزر درمانی، کاهش میزان آسیب های بافتی است.

سوالات متداول زگیل تناسلی

در این بخش از مقاله به یک سری از سوالات پر تکرار بیماران در خصوص این بیماری می پردازیم.

آیا زگیل تناسلی برای همیشه در بدن ما باقی می ماند؟

این را باید بدانید که ویروس hpv که عامل بروز این بیماری است، تحت هیچ روند درمانی از بین نمی رود. اما زائده های گوشتی یا همان زگیل ها که در ناحیه تناسلی ایجاد می شوند، با یکی از راه های درمانی اشاره شده در مقاله، رفع می گردند.

آیا این عارضه واگیر و مسری است؟

کسانی که به بیماری زگیل تناسلی دچار هستند ، می تواند از طریق تماس پوستی با آن ناحیه ، فرد دیگری را به آن مبتلا سازند. عمدتاً این بیماری از طریق روابط جنسی به بین افراد انتقال پیدا می کند.

بعد از چند مدت ممکن است زگیل ها دوباره عود پیدا کنند ؟

اینکه چه مدت بعد از درمان ، فرد عود بیماری را تجربه کند به مواردی همچون میزان فعالیت های جنسی و البته قدرت سیستم ایمنی بدن او بستگی دارد. به طور کلی برخی افراد ۱۲ هفته ، برخی ۶ ماه و گروهی هم یکسال بعد شاهد وقوع مجدد بیماری هستند. البته باز هم نمی توان زمان کاملاً دقیق و یکسانی را برای همه افراد اعلام کرد.

آیا زگیل های تناسلی خطرناک هستند ؟

زگیل ها و گونه ای از ویروس hpv که منجر به بروز این بیماری می شوند ، به خودی خود مشکل خاصی را ایجاد نمی کنند و در اکثر اوقات باعث آزار و اذیت فرد می شوند. اما عدم کنترل و درمان آن ممکن است باعث شود ناحیه درگیر مستعد ابتلا به بیماری جدی تری شود.

آیا ممکن است با نشستن بر روی توالت فرنگی ، به زگیل تناسلی دچار شویم ؟

این بیماری در گروه بیماری های مقاربت جنسی قرار دارد بنابراین عامل وقوع این بیماری تنها از طریق پوست و آمیزش جنسی میان افراد منتقل می شود. با نشستن بر روی توالت فرنگی تماس پوستی صورت نگرفته بنابراین بیماری نیز منتقل نمی شود.

شفا کلینیک

Shafa Clinic



online